

Ferisid®

Supliment alimentar

▲ biodisponibilitate mare

▲ sursă optimă de fier

Fierul elementar, care este ingredientul principal al Ferisid®:

- se caracterizează printr-un conținut foarte mare de fier care depășește 98%
- este considerat a fi cel mai bine tolerat tip de fier în comparație cu sărurile de fier solubile, cum ar fi sulfatul de fier
- mărimea particulelor (7-10 μm) asigură o absorbție optimă (în interval de aproximativ 45 minute), cu o biodisponibilitate de aproximativ 69%
- se transformă într-o formă ionizată în tractul gastrointestinal sub influența sucului gastric, fără a provoca colorarea dinților sau un gust metalic în gură

Ferisid® este o suspensie orală de fier în ulei MCT, bazată pe proprietățile unice brevetate ale suspensiei de fier micronizate, cu **biodisponibilitate mare (69%)**, în uleiul nutritiv MCT ca purtător, utilizată pentru a **furniza fierul care este necesar pentru corpul uman**.

Fierul contribuie la:

- formarea normală a globulelor roșii și a hemoglobinei
- transportul normal al oxigenului în organism
- reducerea oboselei și extenuării
- metabolismul energetic normal
- funcționarea normală a sistemului imunitar
- funcția cognitivă normală

Ingrediente:

pulbere de fier; ulei MCT (trigliceride cu catenă medie ale acizilor grași); aromă naturală de lămâie.

Produs fără gluten, nu conține proteine din lapte de vacă și lactoză și poate fi administrat persoanelor care nu tolerează aceste ingrediente.

Nu conține conservanți, arome, coloranți sau îndulcitori.

Mod de utilizare:

Ferisid® este echipat cu o seringă de dozare cu o scară precisă, care permite măsurarea dozei corecte și administrarea orală directă a cantității măsurate de fier.

Cantitatea și durata de utilizare a produsului depind de necesarul individual de fier.

A se agita suspensia cel puțin 30 de secunde înainte de a extrage din flacon volumul dorit.

După agitare, suspensia capătă o culoare închisă. Saturația de culoare a suspensiei poate varia, de la gri deschis la grafit sau negru, în funcție de lot.

Doza măsurată trebuie administrată imediat după preparare, direct în gură.

Dacă suspensia nu este administrată în 3 minute după ce s-a omogenizat, flaconul trebuie agitat din nou timp de cel puțin 30 secunde.

Copii 4-12 ani: 0,5 ml pe zi

Adolescenți 12-18 ani:

0,6 ml pe zi (băieți) și 0,8 ml pe zi (fete)

Adulți:

0,5 ml pe zi (bărbați) și 0,9 ml pe zi (femei)

Volum de suspensie	Doză de fier	% VNR
0,5 ml	10 mg	71%*
0,6 ml	12 mg	86%*
0,8 ml	16 mg	114%*
0,9 ml	18 mg	128%*

*VNR – Valoare Nutrițională de Referință (Conf. Reg. 1169/2011). Consumul de referință al unui adult obișnuit (8 400 kJ/2 000 kcal).

După administrarea dozei măsurate, din motive de igienă, seringă trebuie spălată cu apă curentă caldă, fără detergent.

A nu se depăși doza recomandată pentru consumul zilnic. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă diversificată și echilibrată și un mod de viață sănătos. A se păstra în ambalajul original, la temperaturi cuprinse între 5°C - 25°C la loc uscat, ferit de umiditate. A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor mici.

Produsul trebuie consumat în 90 de zile, după prima deschidere.

Produs în U.E. pentru Zdrovit România S.R.L.

Distribuitor/Deținător notificare:

Zdrovit România S.R.L.

Str. Sevastopol nr. 13-17, București

Tel.: 021.310.65.15

**fără
gluten | lactoză | zahăr**

